


- پرستار آمپول فلورسئین را از رگ دستتان تزریق خواهد کرد.



- بعد از تزریق فقط چند دقیقه برای عکسبرداری وقت وجود دارد. لطفاً همکاری لازم را بفرمایید. هردو چشم خود را باز نگه داشته و سر خود را حرکت ندهید.
- اگر حالت تهوع و استفراغ به شما دست داد نفس عمیق بکشید. این حالت معمولاً به زودی برطرف می‌شود.
- توجه داشته باشید بعد از اتمام کار، رنگ پوست و ادرار شما زرد تا نارنجی خواهد شد که نگران کننده نیست. برای برطرف شدن، تا دو روز مایعات فراوان مصرف نمایید.

آنژیوگرافی در حقیقت تصویربرداری از پرده شبکیه چشم و رگهای آن است. آنژیوگرافی به صورت سرپایی انجام می‌شود.



- حتماً در روزی که پزشک دستور داده جهت عکسبرداری به بیمارستان مراجعه نمایید.
- روز مراجعه برگ دستور آنژیوگرافی و نسخه مربوط به آمپول فلورسئین را همراه داشته باشید.
- پس از دریافت آمپول از داروخانه و قبض از صندوق، به اتاق آنژیوگرافی مراجعه فرمایید.
- برای انجام آنژیوگرافی نیاز به ناشتا بودن نیست.
- قبل از عکسبرداری، پرستار داخل هردو چشم شما چند قطره گشادکننده مردمک، خواهد ریخت.
- وقتی نوبتتان رسید، راهنمایی می‌شوید پشت دستگاه عکس برداری بنشینید (مثل زمان معاینه چشم).



آنژیوگرافی چشم



واحد آموزش سلامت مرکز چشم پزشکی علوی تبریز

تدوین: ۱۳۹۳

آخرین بازنگری: زمستان ۱۴۰۳

- بعد از ۳۰ - ۱۵ دقیقه جهت دریافت عکس مراجعه نمایید.
نتیجه آنژیوگرافی را به پزشک خود نشان دهید.
در صورت داشتن مشکل قلبی و کلیوی حتماً از قبل به پزشک خود اطلاع دهید.
اگر به دارو یا ماده خاصی حساسیت دارید به پزشک و پرستار اتاق آنژیوگرافی اطلاع دهید.

آدرس: تبریز، میدان پنجم مرداد (بلوار منجم سابق)

مرکز چشم پزشکی علوی

کدپستی: ۵۱۴۶۶۱۴۵۹۹ تلفن: ۳۲۶۶۳۹۳۳ (۰۴۱)

<http://alavihospital.tbzmed.ac.ir>

منبع: اصول چشم پزشکی کاربردی، هاشمی مسیح، همقلم

نسرین (۱۳۸۶)

چشم پزشکی عمومی، جوادی م فیضی س (۱۳۹۶) نشر فردا

تهیه و گردآوری: مشیرآبادی - حسن پور

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

سوپروایزر آموزش سلامت